

Αμεσα μέτρα αναχαίτισης του έιτζ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πρέπει να διανέμονται ετησίως 150 - 200 σύριγγες ανά χρήστη

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Μία μεγάλη και ταχέως αυξανόμενη επιδημία έιτζ είναι σε εξέλιξη στη χώρα μας, με τα «θύματά της» να είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Ο αριθμός των νέων περιστατικών λοίμωξης από τον ιό HIV μεταξύ των χρηστών αυξήθηκε κατά 35 φορές μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια: ενώ τα έτη 2008 -

Ο αριθμός των νέων περιστατικών λοίμωξης μεταξύ των χρηστών αυξήθηκε κατά 35 φορές μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια.


2010 ο αριθμός των περιστατικών κυμαινόταν μεταξύ 10 - 14, το 2011 δηλώθηκαν 206 περιστατικά, ενώ μέχρι τον Οκτώβριο του 2012, 487. Η επιδημία μεταξύ των χρηστών περιορίζεται προς το παρόν στην Αθήνα όπου εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 3.000 άτομα που χρησιμοποιούν σύριγγες. Κυρίαρχος παράγοντας αναδεικνύεται η οικονομική κρίση, αφού οι χρήστες αντιμετωπίζουν συνθήκες πρωτοφανούς ένδειας, με αποτέλεσμα να κάνουν κοινή χρήση συριγγών, αλλά και να έχουν αυξήσει την ενδοφλέβια χρήση νοθευμένων ή νέων πιο φθηνών ουσιών.

Για την αναχαίτιση της επιδη-

Ανσυχητικά αυξανόμενη η επιδημία του έιτζ

Αποτελέσματα του προγράμματος «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» σε 1.400 χρήστες της Αθήνας

Νέα περιστατικά μεταξύ χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών



μίας, ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) Marc Sprenger συστήνει εντατικοποίηση του προγράμματος δωρεάν διανομής συριγγών και βελονών στους χρήστες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ECDC, για να αναχαιτιστεί η επιδημία θα πρέπει να

διανέμονται ετησίως 150 - 200 σύριγγες ανά χρήστη. Όσες διανέμονται στην Αθήνα είναι σαφώς λιγότερες, γι' αυτό και θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες των αρμόδιων φορέων. Όπως ανέφερε χθες σε συνέντευξη Τύπου ο κ. Sprenger, «αν δεν επιτευχθεί μία κλιμάκωση του προγράμματος,

είναι πολύ πιθανό η μετάδοση του HIV μεταξύ των ατόμων που κάνουν ενέσεις ναρκωτικών στην Αθήνα να επιταχυνθεί, καταλήγοντας σε μία υψηλή συχνότητα του έιτζ».

Στη συνέντευξη Τύπου, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Παν. Αθηνών κ. Αγγελος Χατζάκης, η πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ κ. Τζένη Κρεμαστινού, η πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ κ. Μένι Μαλλιώρα και ο διοικητής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας κ. Πάνος Ευσταθίου, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Αριστοτέλης» στο πλαίσιο του οποίου εξετάστηκαν τον περασμένο Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 1.400 χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών.

Θετικό στον ιό του έιτζ ήταν το 19% των Ελλήνων και το 24% των μεταναστών χρηστών. Τον τελευταίο χρόνο το 11% των χρηστών χρησιμοποίησε την ίδια σύριγγα με άλλον χρήστη τουλάχιστον τις μισές φορές. Τα χαρακτηριστικά των ατόμων με αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης ήταν όσοι έκαναν κοινή χρήση συριγγών (27% ήταν οροθετικοί, έναντι του 18% όσων δεν ανέφεραν κοινή χρήση), με αυξημένη συχνότητα ενδοφλέβιας χρήσης, χρήστριες που επιδίονταν σε πορνεία (32% έναντι του 17% που δεν ανέφερε σεξ με αντάλλαγμα), με ιστορικό φυλάκισης και άστεγοι.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ